


Paralysie faciale périphérique

CHU Nîmes,Zemmour-Lallemant2019



RECHERCHER

- PFP/PF Centrale (2 étages, pas de dissociation automatico-volontaire)
- Signes associés :
Otologiques: OMA, OMC, OE, Vertiges

BILAN INITIAL

- Si contexte trauma :TDM rocher
- NFS iono G à jeun
- Serologie EBV, CMV, VZV, VIH Lyme TPHA, VDRL

Prise en charge

PF a frigore

- Solupred 1 mg /kg pendant 7 jours
- Zelirex 500 mg 2cp x3 pendant 7 jours
- Kinésithérapie sans électrostimulation
- Soins oculaires (larmes artif,pommade vit A, occlusion palpébrale nocturne)

Si zona : Zelitrex++ 14 jrs+ctc

Si OMA : Hospitalisation,Paracentese,Antibiothérapie IV (Claforan/flagyl)

Si Otite ext maligne : Hospit,plvmt bacterio,Antibio proba actif sur P aeruginosa puis à adapter (ttt long cours)

Si Sd de Sicard: Hospit, aciclovir IV 10mg/kg/8h (A), 500mg/m²/8h (E) 7j, relai po 7j + CTC 2mg/kg/j 10j (CI si atteinte oculaire)

Si trauma : chir en urgence si immédiat / Sinn CTCthérapie +Vaccin Pn

VERIFIER

- Cs j15 : Audio (tonale,vocale reflexe stapedien) + verif sérologie et suivi évolution avec grade ++
- IRM cérébral/FCP/TC/APC/CAI et rocher + parotide si : progressives, récidivantes, graves non régressives ou syndromiques

Grade de House et Brackmann (pour suivi+++)

Grade I

Mobilité faciale et tonus normaux

Grade II

Dysfonction légère:

- Au repos, visage symétrique et tonus normal
- Aux mouvements, légère asymétrie sans contracture avec présence possible de discrètes syncinésies

Grade III

Dysfonction modérée:

- Au repos, visage symétrique et tonus normal
- Aux mouvements, diminution globale de la mobilité avec asymétrie non défigurante; fermeture oculaire complète avec effort; spasmes et syncinésies modérés

Grade IV

Dysfonction modérée à sévère:

- Au repos, symétrie globalement conservée, tonus normal
- Aux mouvements, asymétrie importante et/ou défigurante; fermeture oculaire incomplète même avec effort; syncinésies ou spasmes sévères

Grade V

Dysfonction sévère:

- Au repos, asymétrie évidente et diminution du tonus
- Aux mouvements, mobilité à peine perceptible au niveau de l'œil et de la bouche; à ce stade, pas de syncinésie ni spasme possible

Grade VI

Paralysie faciale complète; aucun mouvement